



Integrierte Varroabehandlung Konzept 2023 mit Planung und Erfolg:



Varroa der gefährlichste Feind der Bienen

Wenn Völker über den Winter eingehen, liegen die Ursachen meistens hinter dem Kasten.

Die gemeinsame Varroabehandlung ist daher sehr wichtig, denn nur starke vitale Völker sind weniger anfällig auf Krankheiten. Die Virenübertragung durch Varro wird immer stärker. Infizierte Völker überleben den Winter meistens nicht (Kahl Flug etc.)

Die Imkerinnen und Imker sind gefordert, die Varroa Entwicklung übers ganze Jahr zu überwachen und mit nötigen Massnahmen einzubremsen. Damit die Behandlung durchgeführt werden kann, muss frühzeitig abgeräumt werden.

ACHTUNG: Sollte gegebenenfalls Wald-Honig eingetragen werden, so könnt ihr Euch bei den Teamleitern über das weitere Vorgehen informieren.

Arbeiten	Zeitraum
Vor der Behandlung: Abräumen des Honigraumes, schleudern	ca. Mitte Juli, danach 1. Futtergabe
1. Varroa-Sommerbehandlung mit Ameisensäure (Stossbehandlung: = 3 Behandlungen, zwischen jeder Behandlung 1-2 Tage Wartezeit. Oder Langzeitbehandlung)	beginnen am 22. Juli 2023 ca. 1 Woche
weiter auffüttern	
2. Varroa-Sommerbehandlung mit Ameisensäure	2 Wochen je nach Milbenfall kann diese weggelassen, oder verkürzt werden.
Futterkontrolle eventuell fertig auffüttern	

Eine gute Planung ist der halbe Erfolg: In unserem Vereinsgebiet sind 5 Teamleiter Regional zur Unterstützung.

Teamleiter: in den Gemeinden

Wartau: Jürg Senn Gauenweg 1, 9478 Azmoos Tel. P: 081 783 14 10 E-mail: juerg.senn(at)rsnweb.ch

Sevelen- Buchs: Hans-Peter Hagmann Baccastiel 28 9475 Sevelen Tel. 079 681 17 72

E-Mail: betriebsberater(at)bzv-werdenberg.ch

Grabs: Werner Walker Stockengasse 8 9472 Grabs Tel. P: 081 771 39 15

Gams: Werner Hardegger Möösl 11 9473 Gams Tel. P: 081 771 10 69 E-mail: wernerhardegger(at)bluewin.ch

Sennwald: Melchior Huber (Lehrbienenstand LZSG Sennwald T. 078 691 33 45 E-Mail: melchior.huber(at)bluewin.ch

Gesamtkoordination: Hans-Peter Hagmann

Einige wichtige Zahlen:

Im Sommer sind 80% der Milben in der Brut. Eine weibliche Milbe kann sich 3-7x im Jahr in Brutzellen fortpflanzen. Verdoppelung der Milbenzahl innerhalb eines Monats (ab Februar bis Oktober). Eine Milbe ergibt im Jahr 100 Milben, wenn keine Gegenmassnahmen erfolgen. Deshalb ist eine Sommerbehandlung wie oben beschrieben sehr wichtig. 90% der Schäden an Bienenvölkern werden verursacht durch die Varroa.

Wir empfehlen die Sommerbehandlung nur mit Ameisensäure durchzuführen, denn diese wirkt auch in den gedeckelten Brutzellen.

Die Varroa ist der Hauptverursacher der Völkerverluste!

Verschiedene Behandlungsmethoden sind möglich.

Jedes System hat eine andere Anwendung, dadurch werden auch verschiedenen %igen Ameisensäuren verwendet.

Wir empfehlen daher unbedingt die Anwendung gemäss den entsprechenden Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Hersteller vorzunehmen.

Die Anleitungen sind auch auf unserer Website aufgeschaltet, Bienengesundheit >Varroabekämpfung

Siehe auch <http://www.bienen.ch/themen/bienengesundheit/varroa-bekaempfung.html>

Bei Unklarheiten stehen die Teamleiter oder Vorstandsmitglieder zur Verfügung.

Kurzübersicht über die vorgeschlagenen Verdunster:

Übersicht unter: <https://betriebskonzept.apiservice.ch/Home/Load/12>

Methode der Ameisensäure	Säurenkonzentration	Regulierung der Säureverdunstung/Menge
Nassenheider Verdunster professionell	60%ig	Klassischer Nassenheider Verdunster, Dossierung über Grösse des Pappdochtes, die Einfüllmenge (Tank) bzw. über die Anwendungsdauer.
Liebig Dispenser	85%ig	Dosierung über Grösse des Verdunstungspapiers, die Einfüllmenge im Tank und die Anwendungsdauer.
FAM Dispenser	70%ig	Dosierung der Säuremenge beim Aufträufeln auf das Schwammtuch. Regulierung über die Grösse der Verdunstungsfläche.
Formicpro – Streifen	Einfache Anwendung	Imprägnierte Ameisensäure Sreifen, Link zu Bio Vet Keine Materialschlacht <i>Nachteil:</i> eine etwas teurere Lösung

Zwingend beachten bei der Anwendung: Unterlagen verwenden damit der Varroa-Totenfall ausgezählt werden kann.

Warnhinweis im Umgang mit organischen Säuren: Ameisensäure ist ätzend!

- ✓ Bei der Vorbereitung und während der Behandlung säurefeste Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutzmaske, langarmige Bekleidung tragen!
- ✓ Immer ausreichend Wasser bereitstellen, Säurespritzer sofort mit Wasser ab- und auswaschen!
- ✓ Für Kinder unerreichbar unter Verschluss aufbewahren!
- ✓ Nur gebrauchsfertige Lösungen verwenden!

Winterbehandlung: Die Restentmilbung ist eines der wesentlichen Elemente der Varroabehandlung. Im November – Dezember ist eine Nachbehandlung mit Oxalsäure erforderlich (warten auf Brutfreiheit).

Der natürliche Milbenfall sollte nach der erfolgten Winterbehandlung **unter 0,5 Milben pro Tag** liegen!

Information: es dürfen nur zugelassene Behandlungsmittel eingesetzt werden.

Achtung: Der Kauf von Arzneimitteln, deren Einsatz sowie eine allfällige Entsorgung müssen dokumentiert sein, damit eine lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist. Webseite aufgeschaltet. <http://www.bzv-werdenberg.ch/Bienen-Wildbienen/Betriebskonzept-Varroa/>

wir imkern aus Liebe zur Natur, mit der Natur